

แจ้งเตือนการระบาดของโรคสุกใส



จากการติดตามสถานการณ์โรคสุกใสของจังหวัดร้อยเอ็ด ปี ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึง วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีรายงานผู้ป่วยโรคสุกใส จำนวน ๑๙๑ ราย อัตราป่วย ๑๔.๖๐ ต่อ ประชากรแสนคน โรคสุกใส พบการระบาดในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม ของทุกปี

กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ ๕ - ๙ ปี กลุ่มอายุ ๑๐- ๑๔ ปี และกลุ่ม ๐- ๔ ปี ส่วนใหญ่พบการระบาดในศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนประถมศึกษา

ปี ๒๕๖๐ พบผู้ป่วยในทุกอำเภอ อำเภอที่พบผู้ป่วยสูงสุดในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คือ อ.เมืองร้อยเอ็ด ๒๖ ราย รองลงมา คือ อ.โพนทอง ๒๐ ราย อ.ธวัชบุรี ๑๙ ราย และ เสลภูมิ ๑๗ ราย

โรคสุกใส เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ติดต่อโดยการหายใจเอาละอองเสมหะ น้ำมูกและน้ำลาย หรือ โดยการสัมผัสกับตุ่มหนองของผู้ป่วย ตลอดจนการใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย จึงทำให้เกิดการระบาดได้ง่าย โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีการรวมกันหนาแน่น เช่น สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล สถานศึกษา

อาการของโรคสุกใส ระยะแรกหลังติดเชื้อจะมีไข้ต่ำ ๆ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร จากนั้นจะมีผื่นแดงตามผิวหนังบริเวณศีรษะ ใบหน้า ลำตัว ต่อมาผื่นจะกลายเป็นตุ่มหนอง มีน้ำใส ๆ อยู่ข้างในและมีอาการคัน ฐานรอบตุ่มมีสีแดง และตกสะเก็ดภายใน ๒ - ๓ วัน ตุ่มเกิดได้ทั่วร่างกาย ขนาดตุ่มไม่เท่ากัน ระยะฟักตัวของโรคประมาณ ๑๐ - ๒๑ วัน ระยะแพร่เชื้อให้คนอื่น ตั้งแต่ ๒ วัน ก่อนมีผื่นขึ้น จนกระทั่งถึง ๖ วันหลังผื่นขึ้น

ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และในชุมชน จึงขอความร่วมมือให้ทุกอำเภอ เร่งรัดการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการระบาดของโรค ดังนี้

๑. ให้สุกศึกษาประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน และในชุมชนในเรื่องการป้องกันและควบคุมโรค โดยเฉพาะการแยกผู้ป่วย หลีกเลี่ยงการสัมผัสและคลุกคลี และไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย
๒. การประสานงานกับโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมศึกษา และศูนย์เด็กเล็ก ให้มีการตรวจคัดกรองเด็กนักเรียนทุกวัน หากพบเด็กป่วยขอให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายหรือจนกว่าผื่นตกสะเก็ดหายหมดแล้ว
๓. การเฝ้าระวัง และตรวจจับการระบาดโดยเครือข่าย SRRT ระดับตำบล หากพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ให้ออกดำเนินการสอบสวนควบคุมโรคทันที (๓ ร. → รู้เร็ว แจ้งเร็ว ควบคุมโรคเร็ว)